

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP 17-7-65 396013

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST - Arras - Tél. 23.14

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, - Station d'Alertes Agricoles d'ARRAS.  
C. C. P. : LILLE 57-01-67

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

N° LVIII - 16 JUILLET 1965

Supplément n° 1

## AVERTISSEMENTS

### M I L D I O U

#### POMMES DE TERRE

Les dernières pluies orageuses ont été le plus souvent favorables à de nouvelles contaminations et elles ont diminué la valeur de la protection en lessivant en partie les produits.

A partir des petits foyers existants et qui sont le plus souvent stationnaires depuis 1 mois, de nouvelles taches risquent d'apparaître au milieu de la semaine prochaine. Or, cette année, il faudra surtout craindre le Mildiou sur tubercules dans les cultures où la maladie reste présente sur feuille, même en très faible quantité.

En conséquence,

Sur toutes les cultures de consommation qui doivent végéter jusqu'à la mi-août, il est conseillé d'appliquer un nouveau traitement du 19 au 21 Juillet.

Pour les cultures qui sont déjà bien infestées, il sera prudent d'effectuer un traitement cuprique dans les mêmes conditions et en plus de prévoir la destruction des fanes avant le 1er août.

Pour les cultures indemmes et dont la végétation est très avancée, on peut arrêter la lutte mais à condition d'être prêt à défaner aussitôt l'apparition éventuelle du mildiou dans le champ.

### C A R P O C A P S E

#### CULTURES FRUITIÈRES

Le rafraichissement actuel prolonge la durée des risques de pénétrations. La protection doit donc être assurée jusqu'au début-août. Profiter de l'opération pour lutter contre la Tavelure et l'Oïdium.

## INFORMATIONS

### GRASSE DU HARICOT

#### CULTURES LÉGUMIÈRES

(valable uniquement pour les Flandres et la vallée de la Lys)

Les cultures de Lingot du Nord sont parfois très infestées. Dans l'état actuel de nos connaissances, seuls les produits cupriques appliqués à plusieurs reprises à 10 jours d'intervalle peuvent limiter l'extension de la maladie. (dose de 2,5 Kg de cuivre par hectare)

### MILDIOU DE L'OIGNON - SEPTORIOSE DU CELERI

Appliquer un des produits conseillés sur Pommes de Terre pour lutter contre le Mildiou.

### P U C E R O N S

Utiliser un ester phosphorique ou un produit à base de Mevinphos (anciennement Phosdrine) seul systémique autorisé en culture légumière.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,

R. DIVOUX

P. COUTURIER